



INCENDIOS FORESTALES



**CENEPRED**

Centro Nacional de Estimación, Prevención y  
Reducción del Riesgo de Desastres

# ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES DE LA REGIÓN UCAYALI

Julio 2022



## ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES DE LA REGIÓN UCAYALI.

Elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).  
Dirección de Gestión de Procesos (DGP). Subdirección de Gestión de la Información (SGI). CENEPRED, 2022.  
Av. Del Parque Norte N° 313 - 319. San Isidro - Lima – Perú  
Teléfono: 201-3550, correo electrónico: [info@cenepred.gob.pe](mailto:info@cenepred.gob.pe)  
Página web: <https://www.gob.pe/cenepred>

### Equipo Técnico del CENEPRED:

Contralmirante (r) Raúl Luis Esteban Vásquez Alvarado  
Jefe del CENEPRED

Lic. Félix Eduardo Romaní Seminario  
Director de la Dirección de Gestión de Procesos

Ing. Alfredo Zambrano Gonzáles  
Subdirector de Gestión de la Información

Ing. José Luis Epiquién Rivera  
Bach. Ing. Chrisna Karina Obregón Acevedo  
Especialistas de la Subdirección de Gestión de la Información

Econ. Carlos Enrique Guillena Diaz  
Coordinador de Enlace Regional CENEPRED: San Martín, Huánuco, Ucayali, Amazonas

Rodolfo Daniel Gil Anticona  
Ingeniero Geógrafo  
Consultor

### Equipo Técnico del Gobierno Regional de Ucayali:

Ing. Edwin Junior Del Águila Henderson  
Jefe de la Oficina Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana

Ing. Jessica Yanina Neyra Vásquez  
Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres

Ing. Mabel Lazo Arévalo  
Coordinadora del proyecto Incendios Forestales



## TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN .....	5
2	OBJETIVOS.....	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	6
3	ASPECTOS GENERALES.....	6
3.1	UBICACIÓN GEOGRÁFICA .....	6
3.2	ASPECTOS BIOFÍSICOS.....	7
3.3	ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS .....	7
4	DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO.....	8
5	ETAPAS DEL ANÁLISIS METODOLÓGICO.....	10
6	RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN .....	10
7	ELABORACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO .....	11
7.1	ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD.....	12
7.1.1	Factores condicionantes territoriales.....	13
A)	Combustible (cobertura vegetal).....	13
B)	Pendiente.....	15
7.1.2	Factores condicionantes climáticos .....	17
A)	Clima .....	17
B)	Vientos.....	19
C)	Irradiación solar.....	20
7.1.3	Modelamiento de los factores condicionantes .....	21
7.2	FACTOR DESENCADENANTE.....	24
7.2.1	Densidad de incendios forestales .....	25
A)	Registros históricos de ocurrencia de incendios forestales.....	26
B)	Focos de calor .....	26
C)	Áreas afectadas por incendios forestales (cicatrices) .....	28
7.2.2	Modelamiento del factor desencadenante .....	28
7.3	MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES .....	30
8	ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS.....	32
8.1	PATRIMONIALES.....	32
8.1.1	Patrimonio cultural .....	32
8.1.2	Patrimonio natural .....	33
8.1.3	Priorización del elemento expuesto .....	33
8.2	SOCIECONÓMICO .....	41
9	ESCENARIO DE RIESGO .....	41
10	CONCLUSIONES.....	46
11	RECOMENDACIONES.....	47
12	BIBLIOGRAFÍA.....	48
13	ANEXO DE MAPAS .....	50



## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Población del departamento de Ucayali.....	7
Tabla 2. Tipos de combustible predominante según la cobertura vegetal.....	14
Tabla 3. Ponderación de los tipos de combustibles.....	15
Tabla 4. Ponderación de las pendientes.....	16
Tabla 5. Ponderación de variables climáticas (Thornthwaite).....	18
Tabla 6. Fuerza del viento y efectos en tierra según Beaufort.....	19
Tabla 7. Ponderación del promedio anual de energía solar incidente.....	21
Tabla 8. Matriz de factores condicionantes.....	22
Tabla 9. Áreas de niveles de susceptibilidad a incendios forestales en la región Ucayali.....	30
Tabla 10. Priorización del elemento expuesto según el tipo de ecosistema.....	34
Tabla 11. Priorización del elemento expuesto según estrategia de conservación.....	36
Tabla 12. Áreas de niveles de riesgo a incendios forestales en la región Ucayali.....	42
Tabla 13. Elementos expuestos en el nivel de riesgo muy alto por incendios forestales.....	45
Tabla 14. Elementos expuestos en el nivel de riesgo alto por incendios forestales.....	45

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de ubicación del departamento de Ucayali.....	6
Figura 2. Triángulo del fuego para incendios forestales.....	8
Figura 3. Factores de propagación del fuego para incendios forestales.....	9
Figura 4. Tipología de los incendios forestales.....	9
Figura 5. Metodología del escenario de riesgo por incendios forestales.....	10
Figura 6. Modelo del Escenario de riesgo por incendios forestales.....	12
Figura 7. Modelamiento de los factores de susceptibilidad.....	13
Figura 8. Mapa de combustible a partir de la cobertura vegetal.....	15
Figura 9. Influencia de la pendiente en la propagación del fuego.....	16
Figura 10. Mapa de pendientes.....	17
Figura 11. Mapa de condiciones climáticas favorables.....	18
Figura 12. Mapa de fuerza de los vientos.....	20
Figura 13. Mapa de irradiación de energía solar incidente.....	21
Figura 14. Mapa de factores condicionantes para incendios forestales.....	23
Figura 15. Incendios registrados por año en la región Ucayali.....	24
Figura 16. Tendencia mensual de incendios forestales en la región Ucayali.....	25
Figura 17. Histórico de emergencias de incendios forestales por provincia.....	25
Figura 18. Mapa de registros históricos de ocurrencia de incendios forestales.....	26
Figura 19. Mapa de focos de calor históricos de incendios forestales.....	27
Figura 20. Mapa de superficies afectadas por incendios forestales (cicatrices).....	28
Figura 21. Mapa del factor desencadenante - Propagación de incendios forestales (2003 - 2021).....	29
Figura 22. Mapa de susceptibilidad a incendios forestales de la región Ucayali.....	31
Figura 23. Elementos expuestos a incendios forestales.....	32
Figura 24. Priorización del elemento expuesto según el criterio de tipo de ecosistema.....	35
Figura 25. Priorización del elemento expuesto según el criterio de estrategia de conservación.....	37
Figura 26. Buffer generado para aplicar el criterio de priorización según influencia antrópica.....	38
Figura 27. Diagrama de flujo para la asignación de pesos a partir del cruce de los tres criterios.....	38
Figura 28. Mapa de priorización del elemento expuesto ante la ocurrencia de incendios forestales.....	39
Figura 29. Mapa de elementos socioeconómicos, como parte de los elementos expuestos.....	41
Figura 30. Superficie en riesgo muy alto, por provincias.....	42
Figura 31. Superficie en riesgo alto, por provincias.....	43
Figura 32. Mapa del escenario de riesgo por incendios forestales en la región Ucayali.....	44



## 1 INTRODUCCIÓN

En la región de Ucayali se han registrado una cantidad considerable de emergencias históricas registradas por ocurrencias de incendios forestales, la principal causa de los eventos está relacionada a las actividades de quemados con fines de cambio de uso de suelos (actividad ancestral relacionada a la agricultura) que traen como consecuencias la destrucción de la cobertura forestal, la pérdida de fauna silvestre, el deterioro del patrimonio cultural, y la contaminación de las aguas y del aire.

El CENEPRED, en el marco de las funciones otorgadas por la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su Reglamento, ha elaborado el presente trabajo, cuyo objetivo principal es desarrollar el escenario de riesgo por incendios forestales de la Región Ucayali.

El desarrollo de este estudio contó con la colaboración del Gobierno Regional de Ucayali, quien hizo posible la coordinación con las entidades públicas vinculadas a la gestión del riesgo por incendios forestales en la región Ucayali, las cuales proporcionaron la información utilizada en las diferentes etapas del desarrollo metodológico del escenario de riesgo.

El presente documento detalla de manera clara y sencilla la construcción del escenario de riesgo por incendios forestales, en el ámbito de la región Ucayali, con la finalidad de contar con una herramienta técnica de apoyo para la toma de decisiones a nivel regional ante la ocurrencia de incendios forestales.

Finalmente, esta herramienta técnica servirá como un referente para la formulación de planes y documentos de gestión orientados a la prevención y reducción del riesgo de desastres, así como para la respuesta ante los probables daños y/o pérdidas originadas por los incendios forestales en la región.



## 2 OBJETIVOS

### 2.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar el escenario de riesgo por incendios forestales de la región Ucayali.

### 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Elaborar el mapa de susceptibilidad a incendios forestales.
- Elaborar el mapa de los elementos expuestos a incendios forestales.
- Cuantificar los elementos expuestos en todos los niveles de riesgo de incendios forestales.

## 3 ASPECTOS GENERALES

### 3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El departamento de Ucayali está situado ubicado en la parte central y oriental del país, tiene como capital a la ciudad de Pucallpa, Ucayali. Sus límites son por el norte con el departamento de Loreto; por el este con la República del Brasil; por el sur con los departamentos de Madre de Dios, Cusco y Junín y por el oeste con los departamentos de Pasco y Huánuco. Su altitud va desde los 111 msnm (el centro poblado Santa Clotilde – distrito de Callería – provincia de Coronel Portillo), hasta los 2,348 msnm (en las nacientes del río Santa Ana, del distrito Padre Abad – provincia Padre Abad). (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018)

Figura 1. Mapa de ubicación del departamento de Ucayali



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022



### 3.2 ASPECTOS BIOFÍSICOS

En el departamento de Ucayali se distingue por presentar 5 zonas de vida según el sistema de clasificación de zonas de vida de L.R. Holdridge, cada una de las cuales tiene sus propias características en cuanto a climas, suelos, y especies de fauna y flora, conformado en su gran mayoría por bosques húmedos tropicales (63,12%), bosques húmedos premontanos tropicales (13,39%) y bosques muy húmedos tropicales (12,08%), contando también con bosques pluviales premontanos tropicales (5,29%) y bosques muy húmedos premontanos tropicales (1,10%). La primera zona de vida se ubican en el llano amazónico, en las cuatro provincias de la región, principalmente alrededor de los ríos Ucayali, Urubamba y Purús; la segunda zona de vida se distribuye en los siguientes cuatro sectores: Cordillera Azul (provincia de Padre Abad), las cimas más elevadas de la Sierra del Divisor (provincia de Coronel Portillo), la cordillera de El Sira (provincias de Coronel Portillo y Atalaya), así como en los relieves que constituyen la cabecera del río Sepa (extremo Sur de la provincia de Atalaya); la tercera zona de vida se distribuye en los siguientes tres sectores: la cuenca alta y media del río Aguaytía, siguiendo la dirección de los relieves de la Cordillera Azul (provincia de Padre Abad); la Sierra del Divisor, en las cabeceras de los ríos Shesha y Abujao, y la quebrada Yucanya (provincia de Coronel Portillo), y la cordillera de El Sira (provincias de Coronel Portillo y Atalaya); la cuarta zona de vida se distribuye en los siguientes cuatro sectores: Cordillera Azul (provincia de Padre Abad), las cimas más elevadas de la Sierra del Divisor (provincia de Coronel Portillo), la cordillera de El Sira (provincias de Coronel Portillo y Atalaya), así como en los relieves que constituyen la cabecera del río Sepa (extremo Sur de la provincia de Atalaya); y la quinta zona de vida se ubica en los siguientes dos sectores: los relieves que constituyen la cabecera del río Sepa, así como en la cuenca del río Unine, ambos en la provincia de Atalaya. La región norte del departamento de Ucayali es muy accidentada debido a la presencia de la "Cordillera Azul". Tiene montañas de laderas abruptas y valles encajonados; el accidente geográfico más importante es el cañón fluvial formado por el Río Yuracyacu denominado "Boquerón del Padre Abad". Tiene también vertientes casi verticales, con vegetación arbórea y numerosas caídas de aguas cristalinas que tienen alturas superiores a los 100 metros. (Gobierno Regional de Ucayali - Autoridad Regional Ambiental de Ucayali - GRRNyGMA, 2014) (Prom Peru, 2003)

### 3.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Según el INEI 2017, el departamento de Ucayali tiene una población total 405 759 habitantes, donde 200 801 (49,5%) son hombres y 204 958 mujeres (50,5%); además, el 45,8% de la población (185 964 habitantes) pertenece al área urbana y el 54,2% (219 795 habitantes) corresponde al área rural.

**Tabla 1.** Población del departamento de Ucayali.

Ámbito	Población
Urbano	402,144
Rural	94,315
<b>Total</b>	<b>496,459</b>

Fuente: Elaborado por el CENEPRED con información de INEI 2018




En el departamento de Ucayali, según los resultados del censo 2017, existen 145,868 viviendas particulares, el 78,8% (114,932) corresponden al área urbana y el 21,2% (30,936) al área rural. Asimismo, del total de viviendas, el 90,8% (132,475) se encuentran habitadas y el 9,2% (13,393) están desocupadas. Además, el 45,8% de las viviendas tiene abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda, seguidas del 24,4% que utilizan agua de pozo (agua subterránea); el 13,8% cuentan con red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; el 9,6% se abastecen de río, acequia, manantial o similar y el 3,5% viviendas que se abastecen de agua a través de pilón o pileta de uso público, para el consumo humano. Los otros tipos de abastecimiento de agua representan menos del 3%. (INEI, 2018)

## 4 DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO

Un incendio forestal es descrito como el fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales causando daños ecológicos, económicos y sociales. Este fuego es la reacción rápida producto de la unión del oxígeno del aire, la cobertura vegetal como combustible y una fuente de calor. A estos elementos se le denomina triángulo del fuego (Figura 2); que se manifiesta en forma de llamas y humo. (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 2017) (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 2016)

Figura 2. Triángulo del fuego para incendios forestales




Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2020

Una vez que un incendio forestal se ha iniciado, el comportamiento del fuego y su propagación está determinado por tres factores: el tipo de combustible, la climatología y la topografía. A estos tres factores se les conoce como la gran triada (Figura 3).




Figura 3. Factores de propagación del fuego para incendios forestales



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2020

Los incendios forestales son variables, sin embargo, se han distinguido tres tipos que implican diferentes grados de daño en los ecosistemas: **los subterráneos**, el fuego quema el humus y raíces bajo la superficie del suelo o la materia orgánica acumulada en las fracturas de grandes afloramientos de roca, se caracteriza por no generar llamas y poco humo; **los superficiales**, donde el fuego consume los combustibles que se encuentran sobre el suelo como hierbas, pajonales, arbustos, leñas, hojarascas y sin quemar todo el cuerpo de los árboles; y por último, **de copa o corona**, en los cuales el fuego consume completamente a los árboles y se propaga tanto de copa en copa como superficialmente (Villers Ruiz, 2006) (Figura 4).

Figura 4. Tipología de los incendios forestales



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2020



## 5 ETAPAS DEL ANÁLISIS METODOLÓGICO

La propuesta metodológica utilizada, está compuesta por cuatro etapas como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Metodología del escenario de riesgo por incendios forestales



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2020

## 6 RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la elaboración del escenario de riesgo, se utilizó la siguiente información:

- Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA):
  - Focos de calor 2003 - 2022 obtenidos del sensor VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer) del satélite Suomi-NPP y los sensores MODIS (Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada) de los satélites EOS Terra y Aqua.
- Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED):
  - Mapa de pendientes, con base ASTER Global DEM de la colección Terra ASTER de la Japan Space System.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):
  - Centros poblados con información socioeconómica del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017
- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI):
  - Registro nacional de emergencias por incendios forestales (2003 - 2022)
- Ministerio del Ambiente (MINAM):
  - Registro histórico de incendios forestales (2003 - 2021),
  - Mapa Nacional de Ecosistemas (2019),
  - Pérdida de bosque 2001 - 2020
  - Mapa de cobertura vegetal (2016)
- Ministerio de Cultura (MINCUL):
  - Información de monumentos arqueológicos (2021)



- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
  - Cobertura agrícola (2020)
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP):
  - Áreas Naturales Protegidas (2019),
  - Zonas de amortiguamiento (2019),
  - Áreas de Conservación Regional (2019),
  - Áreas de Conservación Privada (2019)
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI):
  - Mapa climático nacional (2020)
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR):
  - Cicatrices de incendios forestales (2017 - 2020),
  - Ocurrencias de incendios forestales (2017 - 2020),
  - Ecosistemas frágiles (2019)
- World Bank Group:
  - Atlas solar global (2019),
  - Atlas de vientos global (2019)

## 7 ELABORACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO


El modelo generado para obtener el escenario de riesgo por incendios forestales de la región Ucayali, se encuentra representado en la Figura 6.

El análisis de susceptibilidad examina el peligro por incendios forestales, considerándose como el principal factor desencadenante a las acciones humanas, mientras que los factores condicionantes han tomado en cuenta los elementos que favorecen o desfavorecen la propagación de los incendios forestales. La identificación de los elementos expuestos comprende los elementos patrimoniales: naturales e históricos-culturales, además de los elementos socioeconómicos y medios de vida de las poblaciones.

La superposición de los mapas de susceptibilidad y elementos expuestos dan como resultado el mapa del escenario de riesgo por incendios forestales.



Figura 6. Modelo del Escenario de riesgo por incendios forestales




Fuente: Elaborado por CENEPRED. 2022

## 7.1 ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD

Este análisis permitirá conocer la predisposición del territorio del departamento de Ucayali a la ocurrencia de incendios forestales, el nivel de susceptibilidad a incendios forestales estará basado en las características del factor desencadenante y los factores condicionantes. El principal factor desencadenante es el fuego producido por las acciones humanas, mediante las quemas (actividad ancestral relacionada a la agricultura) y actos negligentes de arrojar objetos que producen fuego sobre coberturas vegetales secas como cigarrillos encendidos y objetos de vidrio que pueden generar el efecto lupa. Respecto a los factores condicionantes, se ha considerado las características territoriales y climáticas que favorecen la propagación del fuego (Figura 7).



Figura 7. Modelamiento de los factores de susceptibilidad



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2020

### 7.1.1 Factores condicionantes territoriales

#### A) Combustible (cobertura vegetal)

El tipo de vegetación condiciona la intensidad del fuego para cada zona, estas características intrínsecas de la vegetación le brindan cierto grado de probabilidad de incendiarse, propagar y mantener el fuego, esto se conoce como combustibilidad. (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2011); (Ministerio del Ambiente - Gobierno de la República de Panamá, 2015)

El mapa de combustible fue elaborado por el CENEPRED, basándose en la clasificación de tipos de combustible propuesta por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (2011) (Tabla 2). Para ello se utilizó como insumo el mapa de cobertura vegetal de la Zonificación Ecológica Económica de la Región Ucayali (MINAM 2016)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Información homologada con las unidades del Sistema de Clasificación de Cobertura de la Tierra Corine Land Cover (CLC), la metodología Corine Land Cover del año 1990 (CLC90) fue refinada en el año 2000 con la propuesta CLC2000 e Image2000; la primera es una guía para la actualización de bases de datos de cobertura del suelo en Europa, la segunda es una guía estandarizada para el procesamiento de imágenes de satélite.

**Tabla 2. Tipos de combustible predominante según la cobertura vegetal**

ID	Cobertura vegetal (MINAM)	Combustible predominante
1	Agujal/Palmeral	No combustibles
2	Áreas pantanosas	No combustibles
3	Complejo de Orillares	No combustibles
4	Piscigranjas	No combustibles
5	Ríos	No combustibles
6	Superficies de Agua	No combustibles
7	Zonas Urbanas	No combustibles
8	Bosque de Colina Alta	Arboles
9	Bosque de Colina baja	Arboles
10	Bosque de Complejo de Orillares	Arboles
11	Bosque de Lomada	Arboles
12	Bosque de Montaña baja	Arboles
13	Bosque de Montaña media	Arboles
14	Bosque de Terraza alta	Arboles
15	Bosque de Terraza Media	Arboles
16	Bosque con Paca en Colina baja	Arboles/arbustos
17	Bosque con Paca en Colina Media	Arboles/arbustos
18	Bosque con Paca en Lomada	Arboles/arbustos
19	Bosque con Paca en Terraza alta	Arboles/arbustos
20	Bosque con Paca en Terraza baja	Arboles/arbustos
21	Bosque con Paca en Terraza media	Arboles/arbustos
22	Bosque de Terraza baja	Arboles/arbustos
23	Bosque Inundable de Terraza baja	Arboles/arbustos
24	Pacal con Bosque de Colina Alta	Arboles/arbustos
25	Pacal con Bosque de Colina baja	Arboles/arbustos
26	Pacal con Bosque de Lomada	Arboles/arbustos
27	Pacal con Bosque de Terraza baja	Arboles/arbustos
28	Pacal en Bosque de Montaña media	Arboles/arbustos
29	Pacal en Bosque de Terraza alta	Arboles/arbustos
30	Pacal en Bosque de Terraza media	Arboles/arbustos
31	Vegetación de isla	Arboles/arbustos
32	Áreas deforestadas/Bosque secundario	Arboles/arbustos/pastos
33	Bosque Secundario de Colina Alta	Arboles/arbustos/pastos
34	Bosque Secundario de Montaña baja	Arboles/arbustos/pastos
35	Bosque Secundario de Montaña media	Arboles/arbustos/pastos
36	Bosque Secundario de Terraza alta	Arboles/arbustos/pastos
37	Bosque Secundario de Terraza baja	Arboles/arbustos/pastos
38	Bosque Secundario de Terraza Media	Arboles/arbustos/pastos

Fuente: Elaborado por el CENEPRED con información del GORE Ucayali e IDEAM. 2022



Finalmente, se le otorgó una ponderación según esta última clasificación (Tabla 3).


Tabla 3. Ponderación de los tipos de combustibles

Combustible predominante	Nivel de combustibilidad	Peso asignado
No combustible	Muy bajo	1
Árboles	Bajo	2
Árboles / Arbustos	Bajo	2
Árboles / Arbustos / pastos	Medio	3

Fuente: Elaborado por el CENEPRED con información del GORE Ucayali e IDEAM. 2022

El resultado del análisis para el mapa de combustible de la región Ucayali se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Mapa de combustible a partir de la cobertura vegetal



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022


## B) Pendiente

Cuando se genera un incendio, este reaccionará favorablemente a las pendientes más pronunciadas, donde las llamas se acercan más al combustible y propagan el fuego por radiación, convección y contacto con la vegetación precalentada y seca, a su vez las formas del terreno interactúan con las condiciones ambientales como los



vientos y el calentamiento solar para promover o retardar el comportamiento del fuego (Johnson & Miyanishi, 2001) (Omi, 2005) (Figura 9).

Figura 9. Influencia de la pendiente en la propagación del fuego



Fuente: Elaborado por el CENEPRED

Para la elaboración del mapa de pendientes de la región Ucayali (Figura 10), se empleó como base, el modelo digital de elevación (30 metros de resolución) obtenido del proyecto ASTER Global DEM de la colección Terra ASTER de la Japan Space System. Por otro lado, los rangos de las pendientes se adaptaron de la propuesta del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), para de esta manera asignar un peso a cada rango (Tabla 4).


Tabla 4. Ponderación de las pendientes

Pendiente del terreno en grados	Nivel de pendiente	Peso
Muy escarpada: > 45°	Muy alto	5
Muy fuerte: 25° a 45°	Alto	4
Fuerte: 15° a 25°	Medio	3
Moderada: 5° a 15°	Bajo	2
Suave: 1° a 5°	Muy bajo	1

Fuente: Adaptado por CENEPRED de INGEMMET. 2020



Figura 10. Mapa de pendientes



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022

### 7.1.2 Factores condicionantes climáticos

Los incendios pueden ser precedidos por temporadas de déficit hídrico. Las regiones especialmente susceptibles a los incendios forestales son aquellas que tienen una estación seca, marcada con altas temperaturas. Asimismo, pueden agravarse con los fuertes vientos que ayudan a extender el fuego sobre grandes áreas (Smith, 2001).

#### A) Clima


La información usada corresponde al mapa de clasificación climática del Perú, generada por el SENAMHI (2020). La información base de esta clasificación está apoyada en datos meteorológicos de veinte años (1981-2010), a partir de la cual se procedió a formular los "Índices Climáticos" y al trazado de los mismos de acuerdo con el sistema de clasificación de climas de Werren Thornthwaite (SENAMHI, 2020).

Finalmente, las unidades analizadas para el modelo contenían información referida a precipitación efectiva, eficiencia térmica, concentración estacional de humedad, estas variables fueron categorizadas de acuerdo con lo requerido para el modelo de precipitación y temperatura.



Este modelo climático nacional se usó para el territorio de la región Ucayali. Se muestra el resultado del análisis de las variables climáticas regionales en la tabla 5 y el mapa con las condiciones climáticas favorables en la figura 11.

Figura 11. Mapa de condiciones climáticas favorables



Fuente: Elaborado por el CENEPRED con información del SENAMHI. 2022

Tabla 5. Ponderación de variables climáticas (Thornthwaite)

Código de clima	Precipitación efectiva	Concentración estacional de Humedad	Eficiencia Térmica	Peso
A (r) B'	Muy lluvioso	Humedad abundante todas las estaciones del año	Templado	1
A (r) A'	Muy lluvioso	Humedad abundante todas las estaciones del año	Cálido	2
B (r) B'	Lluvioso	Humedad abundante todas las estaciones del año	Templado	3
B (r) A'	Lluvioso	Humedad abundante todas las estaciones del año	Cálido	4
C (r) B'	Semiseco	Humedad abundante todas las estaciones del año	Templado	5
C (r) A'	Semiseco	Humedad abundante todas las estaciones del año	Cálido	5

Fuente: Elaborado por CENEPRED con datos de SENAMHI. 2022



## B) Vientos

La propagación rápida del fuego está predominantemente asociada con el viento, más aún en las pendientes más inclinadas, donde generalmente se originan vientos convectivos locales ascendentes (aire calentado por el terreno) y por lo tanto el fuego tiende a subir rápidamente aumentando en la velocidad de propagación hacia el combustible que está sin arder, provocando su rápida ignición. (Moscovich, Ivandic, & Besold, 2014) (Omi, 2005) .

Para este escenario se ha usado el mapa de velocidades medias de vientos para Perú obtenido del Atlas Global de Vientos, que es un proyecto internacional publicado por el Grupo del Banco Mundial<sup>2</sup>.

Este mapa nos proporciona una estimación de la velocidad media del viento desde 10 a 200 metros sobre el nivel de la superficie y nos muestra las zonas donde existen las mayores concentraciones de velocidades de los vientos. Para el análisis de la región Ucayali se usarán los datos obtenidos a 10 metros de la superficie y para su clasificación se tomó como referencia la escala Beaufort para la fuerza del viento a partir de la velocidad y sus efectos en tierra (Tabla 6) y (Figura 12).

**Tabla 6.** Fuerza del viento y efectos en tierra según Beaufort


Grado Beaufort	Velocidad Beaufort (m/s)	Descripción	Peso
0 a 1	0.0 - 1.5	Calma y ventolina	1
2	1.5 - 3.4	Leve	2
3	3.4 - 5.4	Flojo	3
4	5.4 - 7.9	Moderado	4
Mayor a 5	> 7.9	Molesto a fuerte	5

Fuente: Elaborado por CENEPRED. 2020

<sup>2</sup> El mapa de velocidad media de vientos del Perú fue obtenido del "Global Wind Atlas 3.0, una aplicación gratuita basada en web desarrollada, propiedad y operada por la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). El Global Wind Atlas 3.0 se lanza en asociación con el Grupo del Banco Mundial, utilizando datos proporcionados por Vortex, utilizando fondos proporcionados por el Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético (ESMAP). Para obtener información adicional: <https://globalwindatlas.info> "



Figura 12. Mapa de fuerza de los vientos



Fuente: Elaborado por el CENEPRED con información del Global Wind Atlas (World Bank Group). 2022

### C) Irradiación solar

La intensidad de la radiación solar es mayor cuando la superficie terrestre es perpendicular a los rayos solares (factor de vista óptimo). La perpendicular sobre la superficie variará con la época del año, la hora del día y la latitud (Zárate López, 2004). En general las solanas están sometidas a una mayor insolación por lo que tienen menor humedad y menos vegetación que las umbrías sin embargo esta vegetación como combustible estará más seca, por lo que el fuego avanzará más rápidamente. (EDUCARM, s.f.)

Durante el año, las zonas de menor incidencia e irradiación de energía solar del territorio de Ucayali se encuentran principalmente en el sector sur- oeste, donde se dispone de 4.0 a 5.0 kW h/m<sup>2</sup> de energía solar irradiada, mientras que las zonas de valores de irradiación solar medios predominan en casi la totalidad del departamento de Ucayali (Valores de 5.0 a 5.5 kW h/m<sup>2</sup>). Esta información fue obtenida del Atlas Solar Global, iniciativa de datos abiertos meteorológicos y de radiación solar de países específicos realizadas por el Banco Mundial<sup>3</sup>, ver Tabla 7 y Figura 13.

<sup>3</sup> El mapa de irradiación solar del Perú fue obtenido de "Global Solar Atlas 2.0, una aplicación gratuita basada en web desarrollada y operada por la empresa Solargis s.r.o. en nombre del Grupo del Banco Mundial, utilizando datos de Solargis, con financiación proporcionada por el Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético (ESMAP). Para obtener información adicional: <https://globalsolaratlas.info>




Tabla 7. Ponderación del promedio anual de energía solar incidente

Rango kW h/m2	Nivel de energía solar incidente	Peso asignado
0.0 - 4.0	Muy bajo	1
4.1 - 5.0	Bajo	2
5.1 - 5.5	Medio	3
5.6 - 6.0	Alto	4
6.1 - 7.0	Muy alto	5

Fuente: Elaborado por CENEPRED con datos del Global Solar Atlas (World Bank Group). 2020

Figura 13. Mapa de irradiación de energía solar incidente



Fuente: Elaborado por el CENEPRED con información del Global Solar Atlas (World Bank Group). 2022

### 7.1.3 Modelamiento de los factores condicionantes

La Tabla 8, muestra los pesos asignados a los parámetros de evaluación, según los factores condicionantes: territoriales y climáticos. Es importante mencionar que los valores de los pesos fueron validados por el equipo técnico de especialistas del Gobierno Regional de Ucayali encargado de esta actividad, con base en su experiencia y conocimiento del territorio.

**Tabla 8. Matriz de factores condicionantes**


Parámetros de análisis		Peso asignado
F. C. Territoriales	Combustible	0.50
	Pendiente	0.20
F. C. Climáticos	Climas (Thornthwaite)	0.20
	Vientos	0.05
	Irradiación solar	0.05

*Fuente:* Elaborado por el CENEPRED. 2022

El resultado espacial del modelamiento de factores condicionantes se muestra en la Figura 14.



Figura 14. Mapa de factores condicionantes para incendios forestales



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022




## 7.2 FACTOR DESENCADENANTE

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, 2015), a través de una evaluación de manejo de incendios forestales en Perú, diagnosticó por regiones a las causas antrópicas, como las actividades que generan el cambio de uso de suelo y que usan el fuego para la eliminación o renovación de vegetación, estas prácticas en su mayoría no controladas son desencadenantes de los incendios forestales.

Por otro lado, si bien las áreas naturales protegidas (ANP) en la actualidad cuentan con una “Estrategia de gestión del riesgo e incendios forestales” que les ha permitido reducir su número de hectáreas afectadas, el análisis de causas de ignición en sus ámbitos, sugiere que se dan en un 91% por el cambio de uso de suelos y por quema de pastos como actividad ancestral, y el 9% restante por la quema para obtener leña y por negligencias (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 2016)<sup>4</sup>.

Para la región Ucayali, la información estadística correspondiente a los registros históricos de emergencias de incendios forestales (SERFOR 2020, INDECI 2021, MINAM 2021)<sup>5</sup> del periodo analizado entre 2003-2022, muestra un incremento exponencial de ocurrencias registradas entre los años 2018 y 2020 (Figura 15).

**Figura 15.** Incendios registrados por año en la región Ucayali



Fuente: Elaborado por CENEPRED con información del GORE Ucayali, INDECI, MINAM y SERFOR. 2022


Así mismo, se identificó para la región, que la mayoría de los incendios se han generado en los meses de agosto y setiembre. Este dato se asocia a la temporada seca, donde el fuego es utilizado en el manejo de prácticas agropecuarias y cambios de uso del suelo (Manta, 2017) (Manta Nolasco & León, 2004) (Figura 16).

<sup>4</sup> Referenciado en (SERFOR, 2018)

<sup>5</sup> Información analizada con un corte hasta el mes de abril del 2022.




Figura 16. Tendencia mensual de incendios forestales en la región Ucayali



Fuente: Elaborado por CENEPRED con información del GORE Ucayali, INDECI, MINAM y SERFOR. 2022

Al organizar las frecuencias de incendios forestales por provincias durante el periodo 2003-2022, el resultado concluye que la provincia con mayores registros de incendios forestales es: Coronel Portillo. (Figura 17).

Figura 17. Histórico de emergencias de incendios forestales por provincia



Fuente: Elaborado por CENEPRED con información del GORE Ucayali, INDECI, MINAM y SERFOR. 2022

### 7.2.1 Densidad de incendios forestales


Para la obtención del mapa se elaboró un registro general de la ubicación espacial de incendios forestales con toda la información recopilada, pertenecientes a diferentes fuentes, con la finalidad de contar con una base de datos estandarizada, el tratamiento de estos datos se realizó de la siguiente manera:



### A) Registros históricos de ocurrencia de incendios forestales

Se utilizaron los registros y emergencias históricas de incendios forestales del INDECI, MINAM y SERFOR. A estos, previamente se realizaron los controles de limpieza de datos duplicados por ubicación y fecha, posteriormente fueron unidos a una sola base de datos.

Figura 18. Mapa de registros históricos de ocurrencia de incendios forestales



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022

### B) Focos de calor

- i. Fueron obtenidos a través del conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles (VIIRS). Debido a su mayor resolución espacial de 350 metros, este producto de fuego activo proporciona mayor respuesta sobre los incendios de áreas relativamente pequeñas, así como el mapeo mejorado de grandes perímetros de fuego (Schroeder, Oliva, Giglio, & Csiszar, 2018). Además, esta información fue complementada con los datos de focos de calor de incendios forestales de 1 km de resolución, obtenidos de los sensores MODIS. Para la identificación de posibles incendios forestales en la data descargada se usaron los siguientes criterios:

Para los datos VIIRS, el algoritmo de detección de incendios forestales nos muestra mejoras a las anomalías térmicas obtenidas en el desarrollo de los trabajos de Giglio et al., 2003; Kaufman et al., 1998; Morissette et al., 2005; Schroeder et al., 2008. En el cual los datos con mayor probabilidad de ser



incendios forestales son aquellos que cumplen con los siguientes criterios (Schroeder, Oliva, Giglio, & Csiszar, 2018):

$$BT_4 > 325 \text{ K} \text{ y } \Delta BT_{45} > 25 \text{ K (Durante el día)}$$
$$BT_4 > 295 \text{ K} \text{ y } \Delta BT_{45} > 10 \text{ K (Durante la noche)}$$

Donde:


$BT_4$ : Temperatura de brillo en grados Kelvin

$\Delta BT_{45}$ : Diferencia de temperatura de brillo entre los canales 4 y 5

A su vez para los productos MODIS, 310 K representa la temperatura de brillo mínima requerida para que un dato se considere un píxel de fuego y, según la experiencia operativa de validación, 340 K representa un valor típico para un incendio razonablemente obvio durante el día. Para los datos de fuego nocturnos, los umbrales se alteran adecuadamente para que la mínima temperatura de probabilidad sea de 305K y el valor típico de incendio forestal nocturno validado sea de 320K. (Giglio, Descloitres, Justice, & kaufman, 2003)

- ii. Otra fuente de focos de calor históricos de incendios forestales, son los que fueron proporcionados por el SERFOR, los mismos que ya fueron procesados y filtrados por dicha entidad, fueron adjuntados a la base de focos de calor previa verificación de duplicidad.

Figura 19. Mapa de focos de calor históricos de incendios forestales



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022




### C) Áreas afectadas por incendios forestales (cicatrices)

Esta información fue proporcionada por el SERFOR y permitió conocer la ubicación y magnitud espacial de las áreas afectadas por incendios forestales en el país, por medio de polígonos georreferenciados.

Como se aprecia en el gráfico de la figura 20, las superficies afectadas en 2020 superan considerablemente en su mayoría a las registradas en los años previos. De acuerdo con Ojo Público (Ojo Público, 2021) el contexto pandémico del año 2020 involucró un aumento del 258% de los incendios forestales en toda la Amazonía peruana, con respecto a los registrados en 2019.

Figura 20. Mapa de superficies afectadas por incendios forestales (cicatrices)




Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022

#### 7.2.2 Modelamiento del factor desencadenante

Se modeló por el método de densificación de puntos toda la información de la base de datos de ocurrencias de incendios forestales, dando como resultado las áreas de propagación de incendios forestales, que representan una aproximación a la distribución espacial de estos en el ámbito de la región Ucayali, durante el periodo 2003 – 2022. Posteriormente, se le incluyeron las superficies afectadas del 2017 – 2022, asignándoles valor 5, para obtener el mapa final de factor desencadenante (Figura 21).



Figura 21. Mapa del factor desencadenante - Propagación de incendios forestales (2003 - 2021)



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022



### 7.3 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Este mapa se obtuvo de la unión de los mapas factores condicionantes y mapa del factor desencadenante (Propagación de incendios forestales) (Figura 22).

La Tabla 9 presenta las áreas correspondientes a los niveles de susceptibilidad a incendios forestales en el ámbito de la región Ucayali. Estos se clasifican en 4 categorías: bajo, medio, alto y muy alto.


**Tabla 9.** Áreas de niveles de susceptibilidad a incendios forestales en la región Ucayali.

Nivel	Área aprox. (Ha)	Porcentaje (%)
<b>Muy Alto</b>	7,015.60	0.07%
<b>Alto</b>	2,820,911.84	26.32%
<b>Media</b>	3,571,672.74	33.33%
<b>Bajo</b>	4,317,768.22	40.29%

Fuente: Elaborado por CENEPRED. 2022



Figura 22. Mapa de susceptibilidad a incendios forestales de la región Ucayali.




Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022



## 8 ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS

Los elementos expuestos al peligro de incendios forestales han sido clasificados en patrimoniales y socioeconómicos. Dentro de los patrimoniales se encuentran los naturales y culturales; mientras que en los elementos socioeconómicos se considera la población, las viviendas, la infraestructura y la cobertura agrícola. (Figura 23).

Figura 23. Elementos expuestos a incendios forestales



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2020

### 8.1 PATRIMONIALES

#### 8.1.1 Patrimonio cultural

Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del quehacer humano material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado sea expresamente declarado como tal (Ley N° 28296, Ley General Del Patrimonio Cultural de La Nación, del 21 de Julio del 2004, 2004).

Los monumentos arqueológicos prehispánicos son los bienes materiales inmuebles que constituyen evidencia de actividad humana de época prehispánica, este patrimonio en el Perú es muy vasto debido a las grandes civilizaciones que habitaron este país a lo largo de todo nuestro variado territorio. Con fines de registro, delimitación, investigación, conservación, protección y gestión, se clasifican principalmente en: **Sitio Arqueológico**, espacios con evidencia de actividad humana realizada en el pasado; **Zona Arqueológica Monumental**, conjunto de monumentos arqueológicos, de valor singular y excepcional debido a las relaciones cronológicas, funcionales y de dependencia jerárquica; **Paisaje Arqueológico**, lugares que demuestran el desarrollo de actividades humanas en un espacio concreto en interacción con el ecosistema (Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, Del 3 de Octubre Del 2014, 2014). Sin embargo, también muchos de estos vestigios, en la actualidad conviven cercanos o en medio de coberturas vegetales amenazadas y



expuestas en los últimos años a la presencia de incendios forestales que podrían afectar su legado histórico.

Para el análisis de afectación por incendios forestales que podría sufrir este patrimonio, a la escala de trabajo para la región Ucayali, serán evaluados mediante la exposición a los niveles de riesgo de acuerdo a su ubicación geolocalizada por el Ministerio de Cultura.

### 8.1.2 Patrimonio natural

De acuerdo al Plan de prevención y reducción de riesgos de incendios forestales: “El patrimonio forestal y de fauna silvestre, las plantaciones forestales y las áreas naturales protegidas, existentes en el Perú se considera como elementos de riesgo o expuestos”. (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 2018)

De acuerdo a lo mencionado este análisis ha considerado a los principales **ecosistemas** que forman parte del patrimonio natural de la región Ucayali, y dado que proporcionan bienes y servicios a la población se constituyen en un importante capital natural. (MINAM, 2019).

De igual forma se está considerando a los **ecosistemas frágiles**, que son áreas de alto valor de conservación por su biodiversidad y los servicios ambientales que brindan, y son altamente vulnerables a consecuencia de las actividades antrópicas que se desarrollan en ellos o en su entorno. (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 2020)

Finalmente, las **áreas naturales protegidas** (ANP), también fueron consideradas en el estudio como elementos expuestos naturales, sin embargo, estas áreas cuentan con lineamientos estratégicos referidos al manejo del fuego usados para contribuir a la sostenibilidad de sus ecosistemas y líneas de acción para frenar la amenaza de ser el caso (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 2018). En este grupo se consideró también a las **áreas de conservación regional (ACR) y privadas (ACP)**, debido a que en gran parte están protegidas por similares estamentos.

### 8.1.3 Priorización del elemento expuesto

La experiencia indica que, a lo largo del territorio, los ecosistemas atraviesan diferentes situaciones de amenaza y/o conservación. Se conoce que, en muchos casos a pesar de encontrarse dentro de áreas de conservación, los ecosistemas se ven amenazados por la creciente y acelerada expansión de la frontera agrícola y urbana. En ese sentido, la priorización o ponderación de estas unidades ecológicas no puede ser homogénea a lo largo de toda la región. La priorización del elemento expuesto fue elaborada basándose en los siguientes tres criterios:



### A) Priorización por tipo de ecosistema

La priorización de las unidades de análisis sobre ecosistemas tiene como base el criterio utilizado en el Escenario de Riesgo por Incendios Forestales (CENEPRED, 2020), el cual se fundamenta en los alcances de priorización de trabajos similares de escenarios de riesgo coordinados con especialistas del SERFOR (2019) y del Ministerio del Ambiente (2020) para la elaboración de los escenarios de riesgo por incendios forestales de la región Ancash y del ámbito nacional respectivamente. El resultado final se muestra en la tabla 10 y la figura 24.


**Tabla 10.** *Priorización del elemento expuesto según el tipo de ecosistema*

ID	TIPO DE ECOSISTEMA	PRIORIDAD POR TIPO DE ECOSISTEMA	VALOR
1	Lago y laguna	Muy bajo	1
2	Pantano de palmeras	Muy bajo	1
3	Río	Muy bajo	1
4	Vegetación secundaria	Muy bajo	1
5	Zona agrícola	Muy bajo	1
6	Zona minera	Muy bajo	1
7	Zona urbana	Muy bajo	1
8	Bosque aluvial inundable	Bajo	2
9	Bosque basimontano de Yunga	Bajo	2
10	Bosque de colina alta	Bajo	2
11	Bosque de colina baja	Bajo	2
12	Bosque de colina de Sierra del Divisor	Bajo	2
13	Bosque de terraza no inundable	Bajo	2
14	Bosque montano de Yunga	Bajo	2
15	Pacal	Bajo	2
16	Pantano herbáceo-arbustivo	Bajo	2

*Fuente:* Elaborado por CENEPRED. 2022



Figura 24. Priorización del elemento expuesto por tipo de ecosistema



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022

## B) Priorización por estrategia de conservación

La caracterización en función a la estrategia de conservación califica la resiliencia del patrimonio natural con base a la categoría de uso del área de conservación que la contiene. Aquellas áreas con mayor restricción de intervención o usos directos de sus recursos serán las menos vulnerables y, por ende, más resilientes ante la afectación por incendios forestales.

Los resultados de valoración se muestran en la tabla 11 y la figura 25. El valor 1 corresponde a un nivel de vulnerabilidad muy bajo (equivalente a una resiliencia muy alta), mientras que el valor 5 indica muy alta vulnerabilidad (equivalente a una resiliencia muy baja).

La asignación de valores toma como referencia las definiciones establecidas en la siguiente normativa:

- Ley de Áreas Naturales Protegidas (N° 26834) y el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas.
- Lineamientos para la identificación de Ecosistemas Frágiles y su incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles (RDE-N° 287-2018-MINAGRI-SERFOR-DE).
- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 28296).




Tabla 11. Priorización del elemento expuesto según estrategia de conservación

ID	CATEGORÍAS	CARACTERÍSTICAS	PRIORIDAD POR ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN	VALOR
1	Patrimonio arqueológico	Bienes culturales que, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, están protegidos por el Estado. La presente categoría cuenta con un nivel de resiliencia Muy Alto.	Muy bajo	1
2	Parque Nacional	Uso indirecto (investigación, educación, turismo, recreación). No permite intervención. La presente categoría cuenta con un nivel de resiliencia Muy Alto.	Muy bajo	1
3	Ecosistema frágil	Ecosistemas cuya condición de fragilidad hace que sea mayor la necesidad de protección de este espacio y se establece legalmente su delimitación para el respectivo cuidado. La presente categoría cuenta con un nivel de resiliencia Alto.	Bajo	2
4	Área de Conservación Regional	Uso directo (aprovechamiento y extracción de recursos). Características de manejo parecidas a Reservas Nacionales, Reservas Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunes, Bosques de Protección y Cotos de Caza. La presente categoría cuenta con un nivel de resiliencia Medio.	Medio	3
5	Área de Conservación Privada	Predios de propiedad privada que por sus características ambientales, biológicas, naturales o paisajísticas son reconocidas y conservadas por sus propietarios por iniciativa propia y en forma voluntaria. La presente categoría cuenta con un nivel de resiliencia Medio.	Medio	3
6	Bosque de protección	Uso directo de recursos silvestres. Uso indirecto (turismo, recreación, investigación y educación). Permitido el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre y de productos forestales diferentes a la madera. La presente categoría cuenta con un nivel de resiliencia Bajo.	Alto	4
7	Zona de amortiguamiento	Zonas que requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida. Actividades variadas ocurren dentro de estas áreas. La presente categoría cuenta con un nivel de resiliencia Muy Bajo.	Muy alto	5

Fuente: Elaborado por CENEPRED. 2022



Figura 25. Priorización del elemento expuesto según el criterio de estrategia de conservación



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022


### C) Priorización por área de influencia antrópica

La priorización del elemento en función a la influencia antrópica considera el nivel de exposición del patrimonio frente a la amenaza de la expansión agrícola, comúnmente asociada a la ocurrencia de incendios forestales.

Esta es una capa binaria (Figura 26) que se genera a partir de aplicar un buffer externo de 375 metros (tamaño de un pixel VIIRS para focos de calor) a la acumulación de los datos espaciales de: (1) Pérdida de bosque 2001 - 2020 del MINAM/Geobosques; y (2) cobertura agrícola 2020 del MIDAGRI.




Figura 26. Buffer generado para aplicar el criterio de priorización según influencia antrópica



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022

Una vez obtenidas las capas de los tres criterios de priorización, se aplica el flujo de decisión de la figura 27. El proceso ajusta los valores del mapa de priorización por tipo de ecosistema, en función a su intersección con los mapas respectivos de área de influencia antrópica y de priorización por estrategia de conservación.

Figura 27. Diagrama de flujo para la asignación de pesos a partir del cruce de los tres criterios.




Fuente: Elaborado por CENEPRED. 2022



Como resultado del flujo anterior, se obtienen nuevos valores de priorización del elemento expuesto. Cabe resaltar que, con la finalidad de obtener una leyenda de cinco clases, todas las sumas mayores a 5 son reclasificadas como valor 5 (prioridad muy alta). Además, todas aquellas superficies asociadas a zonas urbanas, agrícolas o cuerpos de agua deben permanecer con valor 1 (prioridad muy baja). El mapa final de priorización del elemento expuesto se presenta en la figura 28.



Figura 28. Mapa de priorización del elemento expuesto ante la ocurrencia de incendios forestales




Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022



## 8.2 SOCIECONÓMICO

Por ser una escala de trabajo regional, el análisis de afectación por incendios forestales incluye elementos socioeconómicos expuestos a los niveles de riesgo hallados, de acuerdo a su ubicación geolocalizada y registrada por las entidades generadoras de esta información. Estos incluyen: Centros poblados (Viviendas y población) e infraestructura, tales como instituciones educativas, establecimientos de salud, estaciones hidroeléctricas y vías (red nacional y red departamental).

Figura 29. Mapa de elementos socioeconómicos, como parte de los elementos expuestos



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022

## 9 ESCENARIO DE RIESGO

El mapa final de escenario de riesgo se obtuvo de la superposición de los resultados obtenidos del análisis de susceptibilidad (mapa de susceptibilidad a la ocurrencia de incendios forestales) y análisis de elementos expuestos (mapa de priorización del elemento expuesto).

Los niveles de riesgo se clasificaron en cuatro: muy alto, alto, medio y bajo, donde el color rojo representa las áreas con nivel de riesgo muy alto, que son aquellas áreas con mayor probabilidad a ser afectadas ante la ocurrencia de este evento.

De acuerdo con los resultados del escenario de riesgo de la región Ucayali, las áreas de mayor riesgo (niveles alto y muy alto) representan el 11.74% del territorio de la región Ucayali (Tabla 12), distribuidas principalmente en las provincias de Coronel Portillo (con 630,517.27 ha



comprometidas), Padre Abad (con 325,227.22 ha comprometidas) y Atalaya (con 289,557.28 ha comprometidas), como se muestra en las figuras 30 y 31.


En la figura 32 se muestra el mapa de distribución de las áreas según el nivel de riesgo por incendios forestales en la región Ucayali.

**Tabla 12.** Áreas de niveles de riesgo a incendios forestales en la región Ucayali

Nivel	Área aprox. (Ha)	Porcentaje (%)
Muy alto	33.91	0.0003%
Alto	1,258,750.57	11.74%
Medio	2,274,106.38	21.22%
Bajo	7,184,477.54	67.04%
<b>Total</b>	<b>2,109,849.42</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Elaborado por CENEPRED. 2022


**Figura 30.** Superficie en riesgo muy alto, por provincias



Fuente: Elaborado por CENEPRED. 2022



Figura 31. Superficie en riesgo alto, por provincias




Fuente: Elaborado por CENEPRED. 2022

La cuantificación de los elementos expuestos se obtuvo de la superposición de los elementos patrimoniales y socioeconómicos con el mapa del escenario de riesgo. Los resultados por nivel de riesgo se muestran en las Tablas 13 y 14.



Figura 32. Mapa del escenario de riesgo por incendios forestales en la región Ucayali



Fuente: Elaborado por el CENEPRED. 2022



**Tabla 13. Elementos expuestos en el nivel de riesgo muy alto por incendios forestales**

NIVEL DE RIESGO		MUY ALTO												
PROVINCIAS		Patrimonio Cultural			Patrimonio natural - ecosistemas (ha)			Socioeconómico						
		Zona Arqueológica	Sitio Arqueológico	Paisaje cultural	Bosque tropical	Bosque de yunga	Pacal	Población y Vivienda			Cobertura Agrícola (Ha)	Infraestructura		
								Centros Poblados	Viviendas	Población		Establecimiento de Salud	Instituciones Educativas	Carretera (km)
1	Atalaya	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2	Coronel Portillo	0	0	0	4.76	0.00	0.00	0	0	0	0.06	0	0	0.00
3	Padre Abad	0	0	0	28.19	0.00	0.00	0	0	0	0.72	0	0	0.00
4	Purus	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Fuente: Elaborado por el CENEPRED con información del MINCUL, INEI, MINSA, MINEDU, MIDAGRI, MINEM, MTC. 2022

**Tabla 14. Elementos expuestos en el nivel de riesgo alto por incendios forestales**

NIVEL DE RIESGO		ALTO												
PROVINCIAS		Patrimonio Cultural			Patrimonio natural - ecosistemas (ha)			Socioeconómico						
		Zona Arqueológica	Sitio Arqueológico	Paisaje cultural	Bosque tropical	Bosque de yunga	Pacal	Población y Vivienda			Cobertura Agrícola (Ha)	Infraestructura		
								Centros Poblados	Viviendas	Población		Establecimiento de Salud	Instituciones Educativas	Carretera (km)
1	Atalaya	0	0	0	194,789.25	92,288.40	0.00	25	1,557	6,194	2,049.36	5	32	53.49
2	Coronel Portillo	0	0	0	585,293.33	4,932.82	5.90	56	2,038	9,000	6,781.10	20	86	52.92
3	Padre Abad	0	0	0	321,106.67	2,310.64	0.00	27	2,391	10,383	12,889.72	6	43	21.47
4	Purus	0	0	0	13,434.18	0.00	0.00	2	29	109	81.07	1	2	2.55
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,114,623.43</b>	<b>99,531.86</b>	<b>5.90</b>	<b>110</b>	<b>6,015</b>	<b>25,686</b>	<b>21,801.25</b>	<b>32</b>	<b>163</b>	<b>130.42</b>

Fuente: Elaborado por el CENEPRED con información del MINCUL, INEI, MINSA, MINEDU, MIDAGRI, MINEM, MTC. 2022



## 10 CONCLUSIONES

- De acuerdo con el número de incendios forestales registrados por año (provenientes de las bases de datos del SINPAD-INDECI, MINAM y SERFOR) entre 2003-2021 la tendencia es ascendente; y se muestra un aumento exponencial de ocurrencias principalmente entre los años 2018 y 2020. Se desconoce si esa tendencia pueda deberse a la creciente accesibilidad de datos y tecnologías, o a algún otro evento en particular.
- De acuerdo con la base de datos de ocurrencias/emergencias de incendios forestales en el periodo 2003 - 2022 (provenientes del SINPAD-INDECI, MINAM y SERFOR), la provincia del departamento de Ucayali con mayor cantidad eventos ocurridos a lo largo de este periodo fue: Coronel Portillo. Asimismo, los resultados del escenario de riesgo muestran que las provincias con mayores niveles de riesgo (alto y muy alto) son: Coronel Portillo (con 630,517.27 ha comprometidas), Padre Abad (con 325,227.22 ha comprometidas) y Atalaya (con 289,557.28 ha comprometidas).
- El resultado del escenario de riesgo por incendios forestales nos muestra que el 0.0003% (33.91 ha aproximadamente) del territorio de la región Ucayali está expuesto a riesgo muy alto. Así mismo el 11.74% (1,258,750.57 ha aproximadamente) está expuesto a riesgo alto.
- Del análisis detallado del patrimonio, se concluye que el ecosistema con nivel de riesgo muy alto por incendios forestales es principalmente: el bosque tropical (32.95 ha). En cuanto a los ecosistemas con nivel alto de riesgo, los predominantes también son: el bosque tropical (1,114,623.43 ha) y el bosque de yunga (99,531.86 ha).
- Dentro de los elementos socioeconómicos expuestos, no existen centros poblados, establecimientos de salud, instituciones educativas ni carreteras de la región Ucayali que presenten un nivel de riesgo muy alto ante incendios forestales. No obstante, existen 0.78 ha de área agrícola que muestran un nivel de riesgo muy alto ante incendios forestales. Mientras que, aquellos elementos que cuentan con un nivel alto de riesgo son 21,801.25 ha de área agrícola, 110 centros poblados, 32 establecimientos de salud, 163 instituciones educativas y 130.42 km de carretera.



## 11 RECOMENDACIONES

- Es necesario que las entidades técnicas competentes en incendios forestales de la región Ucayali, desarrollen bases de datos de manera articulada, estandarizada y georreferenciada, que integren los registros de las diferentes fuentes recopiladoras, considerando las características de los eventos como severidad o intensidad, tiempo de duración, área afectada, daños y/o pérdidas, entre otras.
- El presente trabajo servirá como insumo para la formulación de los planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres por Incendios Forestales de la región Ucayali, para implementar medidas preventivas y correctivas del riesgo, a su vez puede servir como referencia para los planes de contingencia ante incendios forestales en la región y así priorizar sus ámbitos de intervención.
- Los ejecutores de la gestión del riesgo regional y local tienen en este trabajo la focalización de las zonas donde pueden generar estudios y/o escenarios de riesgo a escalas más detalladas, que les permita planificar las acciones correspondientes a los procesos de prevención y reducción ante incendios forestales.
- La escala de trabajo utilizada en este escenario de riesgo es para un análisis territorial a nivel regional, por tanto, se recomienda que, para trabajos a nivel local, se trabajé con información a escalas más detalladas siguiendo y adecuándola a la metodología propuesta en el presente estudio.
- Difundir el presente escenario de riesgo por incendios forestales a las entidades regionales que vienen trabajando en todos los procesos de la gestión del riesgo de desastres.
- Establecer acuerdos interinstitucionales para la actualización periódica de este escenario; permitiendo no solo el conocimiento de la situación actual, sino también la comparación multitemporal del mismo para la adecuación de la estrategia preventiva y el reconocimiento de las buenas prácticas en la gestión.



## 12 BIBLIOGRAFÍA


- Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. (2020). *Escenario de riesgo por incendios forestales*. Lima.
- EDUCARM. (s.f.). *Bloque: Incendios Forestales*. Obtenido de <http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/20/tema1incendios.pdf>
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. (2021). *Estrategia y Plan de Acción Regional de la Diversidad Biológica de la Región Huanuco*. Huanuco: Gobierno Regional de Huanuco.
- Giglio, L., Descloitres, J., Justice, C. O., & Kaufman, Y. J. (2003). An Enhanced Contextual Fire Detection Algorithm for MODIS. *Remote Sensing of Environment*, 87, 273-282.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2011). *Protocolo para la realización de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la cobertura vegetal - Escala 1:100,000*. Bogotá.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (01 de Octubre de 2018). *Tomo I - Departamento de Ucayali*. In INEI (Ed.). Obtenido de Resultados definitivos Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas: [https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1570/10TOMO\\_01.pdf](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1570/10TOMO_01.pdf)
- Johnson, E. A., & Miyanishi, K. (2001). *Forest fires - Behavior and ecological effects*. California: Academic Press.
- Manta Nolasco, M. I., & León, H. (2004). Los incendios forestales en el Perú: Grave problema por resolver. *Floresta*, 32, 179-189.
- Manta, N. M. (2017). *Contribución al conocimiento de la prevención de los incendios forestales en la sierra peruana*. Lima: Universidad Nacional Agraria La Molina.
- Ministerio del Ambiente - Gobierno de la República de Panamá. (2015). *METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN DE CAUSAS QUE PROVOCAN LOS INCENDIOS FORESTALES*. Obtenido de METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN DE CAUSAS
- Moscovich, F. A., Ivandic, F., & Besold, L. (2014). *Manual de combate de incendios forestales y manejo de fuego*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- Ojo Público. (9 de noviembre de 2021). *Los incendios forestales asfixian a las regiones de la Amazonía del Perú*. Obtenido de <https://ojo-publico.com/3145/los-incendios-forestales-asfixian-la-amazonia-del-peru#:~:text=El%202020%20estos%20desastres%20en,%2C%20Puno%2C%20Hu%C3%A1nucayo%20y%20Jun%C3%ADn>
- Omi, P. N. (2005). *Forest fire : a reference handbook*. In ABC-CLIO Inc (Ed.), *Contemporary World Issues*. 2005: ABC-CLIO.



- Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, I., & Csiszar, I. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85-96.
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. (2016). *Manual para el control de incendios forestales - Parque Nacional del Manu*. Lima.
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. (2018). *Estrategia de gestión del riesgo de incendio forestal en el sistema nacional de áreas naturales protegidas por el estado*. Obtenido de [https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/475395/estrategia\\_incendio-forestal-baja.pdf](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/475395/estrategia_incendio-forestal-baja.pdf)
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2017). Acta de acuerdo del grupo de trabajo interinstitucional.
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2018). *Lineamientos para la identificación de ecosistemas frágiles y su incorporación en la lista sectorial de ecosistemas frágiles*. Obtenido de <https://www.serfor.gob.pe/portal/lineamientos/lineamiento-para-la-identificacion-de-ecosistemas-fragiles-y-su-incorporacion-en-la-lista-nacional-de-ecosistemas-fragiles>
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2018). *Plan de prevención y reducción de riesgos de incendios forestales (p.55)*. Obtenido de <https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Plan-de-prevención-y-reducción-de-riesgos-de-incendios-forestales.pdf>
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2020). *Protocolo de actuación interinstitucional para gestionar y proteger los ecosistemas incluidos en la lista sectorial de ecosistemas frágiles*. Lima.
- Smith, J. (2001). *The Facts on File Dictionary of Weather and Climate (The Facts on File Science Dictionaries)*. Checkmark Books.
- USAID. (2015). *Reporte de Evaluación del Manejo de Incendios Forestales en el Perú*.
- Villers Ruiz, M. d. (2006). Incendios Forestales. *CIENCIAS*, 61-66.
- Zárate López, L. G. (2004). *Estudio de las características físicas y geométricas de la llama en los incendios forestales*. Cataluña: Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de Ingeniería Química.



## 13 ANEXO DE MAPAS



**ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES REGIÓN UCAYALI**

**MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES**


- Muy Alto
- Alto
- Medio
- Bajo

Fuentes:  
 GORE UCAYALI, SERFOR, SENAMHI, MINAM, INEI, SENSORES VIIRS y MODIS (NASA), ASTER DEM -30m (JAXA), GLOBAL SOLAR ATLAS y GLOBAL WIND ATLAS (WORLD GROUP BANK).

Fecha: Agosto 2022

Elaborado por CENEPRED





### ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES REGION UCAJALI

### MAPA DE PRIORIZACIÓN DEL ELEMENTO EXPUESTO SEGÚN SU AFECTACIÓN

- Muy Bajo
- Bajo
- Medio
- Alto
- Muy Alto


Fuentes: GORE UCAJALI, SERFOR, SENAMHI, MINAM, INEI, SENSORES VIIRS y MODIS (NASA), ASTER DEM -30m (JAXA), GLOBAL SOLAR ATLAS y GLOBAL WIND ATLAS (WORLD GROUP BANK).

Fecha: Agosto 2022

Elaborado por CENEPRED



Datum: WGS 1984  
Coordenadas Geográficas



### ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES REGIÓN UCAYALI

### MAPA DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES

- Muy Alto
- Alto
- Medio
- Bajo

Fuentes:  
 GORE UCAYALI, SERFOR, SENAMHI, MINAM, INEI, SENSORES VIIRS y MODIS (NASA), ASTER DEM -30m (JAXA), GLOBAL SOLAR ATLAS y GLOBAL WIND ATLAS (WORLD GROUP BANK).

Fecha: Agosto 2022

Datum: WGS 1984  
 Coordenadas Geográficas



Av. Del Parque Norte 313 - 319. San Isidro Lima - Perú  
Central Telefónica: (051) 2013550